



5.9.391

R A R I O R E S
OBSERV. MEDICO-PRACTICO-ANATOMICÆ
A D O C T.
CASPARO M. FORLANI
MEDICO-PHYSICO, AC CHIRURGO
E T
IN SENENSI ACADEMIA
PUBLICO PHYLOSOPHIÆ PROFESSORE
E D I T Æ
DECAS PRIMA.



SENIS MDCCLXIX.
EX TYPOGRAPHIA ALOYSII, ET BENEDICTI RINDI
~~~~~  
SUPERIORUM FACULTATE.

THE  
LIBRARY OF THE  
MUSEUM OF  
COMPARATIVE ZOOLOGY  
AT HARVARD UNIVERSITY  
1280 DIVINITY AVENUE  
CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02138  
U.S.A.



RECEIVED  
JUN 19 1964  
MUSEUM OF COMPARATIVE ZOOLOGY  
HARVARD UNIVERSITY  
CAMBRIDGE, MASS.



# AD LECTOREM



Uamquam in dies Librorum copia, Medicorum potissimum undique obruimur, ut vix in tam angusto humanæ vitæ curriculo, non studiosi tantum tyrones, verum etiam ipsi in litteraria Republica emeriti viri tot jam vul-

A 2

ga-

gatas observationes Medico - Phifico - Anatomicas animo vel leviter possint percurrere; Attamen, humanissime Lector, tibi non ingratum, molestumve fore confido, quod hæc meas in lucem ediderim. Satis quidem noveram, quàm parum illis, sive eruditionis, sive criticæ artis dotibus, quibus undique ætas nostra cæteras antecellit, essem instructus; mihi que optandum adhuc plane videbatur, quod in aliis suscipere non desino. Quamobrem nefas mihi in Republica litteraria gradum ullum vindicare intelligebam, ad quem viris tantum numeris omnibus absolutis licet contendere: Quorsum ( hæc animo  
me-

mecum versabar) tenet infanabile<sup>5</sup>  
multos scribendi cacoethes, ægro-  
que in corde senescit? (a) Qui-  
nam Tu inter eruditorum agmen  
elucubrationibus hisce minutis a-  
liquod te publico afferre posse ar-  
bitraris emolumentum, cum pu-  
blicæ commoditati, & humani  
corporis saluti, viri sapientissimi  
Morgagnus, Eruditissimus Hal-  
ler, Friderig. Hoff-mannus, Bo-  
nettus, Hildanus, Heisterus, Ve-  
rheyenus, Cowpperus, Keilifus  
cum notis D. Pauli, Malpighius,  
Burdonus, Mangetus, Drakius,  
Lifterus, Bohonius, Fantonius,  
Cheseldenus, de arte Anatomica,  
Eustachius cum notis Eruditiss.

A 3

Al

(a) V. Juvenal. Sat. 7.

Albini, Kulmus &c., cl. noster Tabarrani, aliique celeberrimi Auctores infudaverint, qui de aliqua humani corporis parte, vel de toto corpore egregie scripserunt, pluresque adhuc alii infudent? Qua demum ratione te justam censuram declinaturum confidis, cum ea ætate ad scribendum incumbas, qua vix optima probantur, qua minus perfecta ad Pharmacopolarum schedas ad complicandum piper condemnantur? At vero fœria hæc mente volventi illud occurrit, litterarium campum ad eruditionis novæ flores excerptos non ab iis tantum adiri, quorum est minus concinnos censoria virga secando notare, verum & ab aliis,



7

aliis, quorum est non inutilis col-  
ligendo proficere, juxta Sectani  
monitum (a) -- scripsimus hæc a-  
nimo dociles, studioque juvandi, --  
hinc veniam te daturum confido,  
si quid apud nos aut scribendo,  
aut scripta vulgando peccatum,  
ubi noveris, non cenodoxia, sed  
juvandi prurigne peccatum: Enim  
vero, uti docet Medicorum Prin-  
ceps Hippocrates (b), aliique sa-  
pientissimi viri, qui in Medicis  
rebus operam navarunt, summam  
utilitatem ars Medica ex Historiis  
per minutas illas in humano cor-  
pore observationes, Anatomia du-  
ce, quotidie se capere gloriatur.

A 4

Id

(a) V. Sat. 3.

(b) V. Epid.

Id equidem ab antiquis illis Medicæ artis prudentibus Græcis omni studio, cura, atque exercitatione servatum esse comperimus: hinc undequaque ab iis votivæ tabulæ in templis Esculapio, tamquam numini celebrato, dicatæ, in quibus morborum historiæ depictæ erant, veluti Medicinæ trophæa circumferebantur. Neque tamen ab omni censura immunes esse contendo Græcos illos ex scola *Coa* profluentes, cum figmenta multa & Chimeras de quibusdam rebus nobis tradiderint, quas hisce temporibus Medici accuratissimi penitus in abditam vitæ, & sanitatis naturam lynceis, ut ita dicam, oculis inspicientes, per Practicas

eticas observationes, & partium corporis nostri, viscerumque officia commodius, quam olim Græci explicaverunt. (a) Medicinæ profecto nihil opportunius potuit accidere, neque prestantius, quam a nostris inventus sanguinis circuitus, veteribus incognitus, vel certe non rite nobis ab iis explanatus, quod quidem inventum anatomiae practicæ observationibus debemus (b). Id autem cum primum prodiit, tanta lux scientiæ  
Me-

(a) V. cl. Verna de Plurit. P. 2. c. 1. p. 59. -- ait -- In Praxi enim quandoque minutia haud collecta, „ veluti minuta scintilla neglecta magnum sæpe excitavit incendium, tam ad ægri salutis jacturam, quam „ nominis Medici ruinam &c. --

(b) V. cl. Arveuf. Diff. de motu Cordis Francfort. 1626.

Medicæ affulsit , ut inde Medicus distinctè macchinæ nostræ vitam , æque ac sanitatem potuerit perspicere a continuis ingestionibus , & egestionibus , ex quibus sanguis efficitur , quarum alterutra si deficiat , vel forte modum , aut proportionem excedat , sanitas in humano corpore periclitari facile intelligatur (a) . Verum enim vero , qui hæc , multaque alia theorematâ in arte Medica suo perscrutatus sit ingenio , solidam ille medicinæ theoriam , & praxim potissimum , repetitis observationibus in ratiocinatione rectoque rationis usu ,

(a) V. Frid. Hoff-manus . Diff. 2. De recta , & simpliciss. Naturæ medendi methodo -- Opuse. Medico Practica .

usu, & prudentia fundasse dicendum est; Unde optimè Hipp. (a) ait --  
 „ Quod Medicus omnia bene fun-  
 „ data ratiocinatione facere de-  
 „ beat, & quod opinio in me-  
 „ dicina in crimine vertenda sit,  
 „ quia perniciem affert -- Quod  
 cum ita sit, quis porro ambiget  
 asserere rationem Medici eam ef-  
 se, quæ experientiam, & obser-  
 vationem dirigat, easdemque me-  
 dicas observationes, & experien-  
 tias rationali judicio, & theorica  
 destitutas, infidam esse empiricen,  
 mutilamque? Quis sana dubitave-  
 rit Philosophiam, ex qua magis,  
 magisque ars nostra increvit, præ-  
 cedere oportere Medicæ experien-  
 tiæ,

(a) V. l. de Arte.

tia, & observationi? O vitæ Philosophia dux, o virtutis indagatrix .... Quid non modo nos, sed omnino vita hominum sine te esse potuisset? (a) Quod si ita Medicus, Philosophia duce, medicinam didicerit, tunc demum, & Pathologiam, sive morborum notitiam secundum mechanica principia, & semioticam, sive morborum prædictionem ex signis, denique Physiologiam, sive doctrinam de usu partium in anatomicis demonstrationibus optimè cognoscet, atque perpendet, ut sapiens Philosophus, qui teste Hippocrate *Isotheos* idest Deo similis erit. Vulgaris etiam error ille est, si  
 theo-

(a) Opposite scripsit Cicer. Tufcul.

theorias in arte medica ab observationibus semotas, vel ab experientiis anatomicis rerum omnium magistris, perscrutari velimus, cum in praxi medica, & Medici ratiocinatione summa rerum artis medicæ consistat; Ex eo autem errore fit, ut remediorum usum, & abusum, in quo ordo medicinæ practicæ versatur, ut optimè observat Fridericus Hoff-mannus; (a) perperam aliqui pseudomedici distinguant; Quare nil mirum, quod nostra etiam tempestate plerique hominum medicos iisdem querimoniis, contumeliisque prosequantur, quas olim

(a) V. Diff. De Naturæ, & Artis efficacia in moriendo. Opus. 1. Medic. practica.

olim in artem illam, quam Deus  
O. M. in morborum remedium no-  
bis e Cælo impertiri voluit mi-  
seris — Altissimus de Cælo crea-  
vit Medicinam (a) pleno ore ef-  
fundebant Ethnici,

*Ars facit, ut valeant homines,  
sed tempore nostro*

*Non fruimur medicæ tam satis  
artis ope (b).*


Atque id maximè fuit in cau-  
sa, cur tibi, humanissime Le-  
ctor, jure optimo hæc meas,  
qualescumque sint Medico--Phyfi-  
co--Anatomicas observationes of-  
ferrem. Qua in re siquid me,  
fortunante Deo, profecisse intel-  
le-

(a) V. Ecclef. 38.

(b) V. Ovidio.



lexero , bene collocatam putabo  
 industriam meam , animoque eri-  
 gar ad novas in dies elucubratio-  
 nes exhibendas , juxta Venusini  
 effatum – *Quod Medicorum est ,*  
*promittunt Medici* (a) – Vive ,  
 & bono , quo damus , accipias  
 animo , & vale .



OBSER-

(a) V. L. 2. Epist. 2.

1. The first part of the paper discusses the importance of the study of the history of the United States. It is argued that the study of the history of the United States is essential for a full understanding of the country and its people. The paper then discusses the various methods used by historians to study the history of the United States, including the use of primary and secondary sources, and the use of statistical methods.

2. The second part of the paper discusses the importance of the study of the history of the United States. It is argued that the study of the history of the United States is essential for a full understanding of the country and its people. The paper then discusses the various methods used by historians to study the history of the United States, including the use of primary and secondary sources, and the use of statistical methods.

3. The third part of the paper discusses the importance of the study of the history of the United States. It is argued that the study of the history of the United States is essential for a full understanding of the country and its people. The paper then discusses the various methods used by historians to study the history of the United States, including the use of primary and secondary sources, and the use of statistical methods.



## OBSERVATIO I.

**A**gricolæ uxor, Anno-  
rum triginta quatuor  
circiter, matrimonio  
coniuncta quinque ab  
hinc Annis, temperamenti cole-  
rico-melancolici ad cachexiam  
B ten-

tendentis, habitu corporis pingui,  
 & ad laborem rure assueta, jam  
 duobus ab hinc annis filiam pe-  
 perit, quæ adhuc prosperam,  
 ac vegetam vitam ducit. Tem-  
 pore, quo malignæ ( sic vulgo  
 dictæ (a) ) exanthematicę febres  
 Urbem inceſſerant, febre putri-  
 da petecchiali affecta fuit, sta-  
 timque a familiari suburbano chi-  
 rurgo advocato sanguinis missio-  
 ne è brachio ad uncias fere duo-  
 decim curata fuit, & absque alio  
 auxilio per duos fere dies reli-  
 cta. Quarta vero die domestici  
 ex nulla ipsius morbi remissione  
 valde exterriti, unanimi consen-  
 su

(a) V. cl. Antonius de Haen-Ratio Medendi P.  
 3. c. 1. P. IV. c. 1., & P. V. c. 1.

fu illam in hoc Regium Senarum  
 Nosocomium commodè transtule-  
 runt. Et revera supradicta febre  
 eam laborare cognitum est, nec  
 non virium prostratione esse affe-  
 ctam, cum magno capitis dolore,  
 siti, lingua viscida, ac mucosa  
 albicoloris materia coopercta,  
 pulsu inequali, languido, & ali-  
 quantisper parvo cum alvi segni-  
 tie, & facie nimis squallida. In-  
 terim sæpe sæpius demissa voce  
 conquerendo aiebat, se trium  
 mensium graviditate laborare.

In hoc rerum statu ad sitis  
 extinctionem præscripsi aquam ni-  
 tram, & pulveres Hoffmanni  
 absorbentes, paratas nempe ex  
 nitro, oculis cancerorum fluviali-  
 li-

libus, & cinnabaro nativa: nec non sanguinis missio ex alio brachio pariter iterata fuit. Hic vero sanguis in catino altera die, nempe quinta meis oculis perlustratus, crusta glutinosa, summæque consistentiæ æquabiliter coopertus comparuit; atque hac ipsa die jactatio, vigilia, nec non dolores in regione umbilicali acceperunt. Juxta quintæ diei finem, pulsus in altum profiluere cum summa vacuitate; noctu vero sub sextæ diei cursum, per totum corporis ambitum maculæ intensi rubri coloris ad nigrum vergentis eruperunt. Abortum prædixi; & revera circa hujusce sextæ diei finem, & septimæ principium, diarheæ  
cum

cum molestissimis torminibus toto abdomine coniuncta supervenit, & noctu ex naribus hæmorrhagia aliquatenus copiosa, quæ diarrheam sustulit. Nihilominus vero febris periodus ad propriam, & insitam durationem perduravit; sed maculæ citius evanerunt, & tormina magis, ac magis sævierunt, & crudeliter suum juxta uteri regionem imperium confirmarunt; tamen jactatio cum vigiliis, & convulsionibus in brachiis, ac supradicta diarrheæ ad blandam tranquillitatem, emollientium ope, devenerunt. Octavam autem morbi diem sic calamitosè illa transegit. Nona vero dolores sunt aucti, & circa dimi-

diam noctem sanguis ad pudenda in conspectum venit, & noctu circa decimi principium, molam carnosam, magnitudine ovi circiter anserini edidit cum torminibus, & eo sanguinis profluvio, ut quam citissimè trium subsequantium dierum spatio plus novem libras profuderit. Subsequenti autem tempore, ac rectius circa decimam tertiam diem, facies nimis collapsa, & Hippocratica, ab ipsomet Hippocrate sic dicta, comparuit, cum pulsibus vix quidem sese manifestantibus, una cum tendinum subsultibus in carpis, & summa circulationis inertia. Verum triduo post partum, vel proprii hujusce morbi deci-



decimatertia die prædicta, juxta noctem crudelis rigor, una cum convulsionibus, & magna jactatione per sesquihoram apparuit; deinceps vero octo post horas nempe, quam abundantissime sudavit, & vix quidem per inferiora; unde ex ipsomet novo morbi statu quam rapidè ventum est ad chinæ chinæ usum. Decima vero quarta die, vel quarta post partum, eadem hora idem crudelis rigor, convulsiones, & sudorum diffusiones per superiora denuo accesserunt; & tandem circa decimæ quartæ diei principium, iterum accessit idem anxiosus rigor febrilis, in cujus dimidio quam rapide jam præmunita Sacrosanctis

Ecclesie actibus, stertendo vitam cum morte commutavit.

Ex hac morbi historia exterritus, avide, & cum ingenti cura ad cadaveris sectionem una cum amicis me ipsum transtuli; & quoniam, ex tota morbi ratione ferre omnia symptomata ex viscerum abdominalium labe evenire satis, superque patuit; ideo ab ipsomet abdomine initium fecimus, ac primum sejunctis integumentis, abdominalis musculis, & peritoneo, ileum intestinum aliquantisper inflammatum præter naturam, & ab aere tumidum supra modum conspeximus; utrum vero in aspectu externo in transversum utroque latere magis extensum, ac magis  
in

in sinistra parte : Verum enim vero dissectum transversè circa fundum ; curiosè , & magna admiratione oculis perlustrantes comperimus divisum esse per longum in duas sejunctas cavitates , intersepti , seu columnæ ope , quæ ejusdem erat substantiæ , ac uterus , & validioris circa fundum , tenuiorisque in inferiori parte , in qua finem suum habebat , priusquam ad uteri osculum devenisset , ita ut ambæ cavitates solummodo hoc in loco in unum confluerent . Sinistra pars vero aliquantisper angustior dextera , inflammata , & omnia speciatim sanguifera vasa , ex quibus conficiuntur parietes , majoris amplitudinis ,

nis, & crassitie erant: & circa fundum ejusdem partis, molæ portiuncula adhærebat, quæ erat ejusdem substantiæ, ac mola ipsa vitæ tempore in lucem jam edita. Inferior pars vero fere tota gangrenosa comparuit, juxta nimirum uteri osculum. In dextera autem parte nil fere, quod ad ipsius substantiæ alterationem spectat, affulsit; sed quam rugosa erat, flacida, & laxa, nimiaque capacitatis respective, ad totam naturalem uteri amplitudinem, in qua probabiliter unica ex ea nata filia concepta fuit, ac enutrita per totum gestationis tempus. Tandem partem uteri inferiorem, in qua ambæ inter sese commu-  
nio-

nionem habebant, valde inflammata[m] conspeximus, & hinc inde fædis maculis gangrenosis circumperfam, speciatim in osculi corona, & in qua sanguis grumefactus, ac fere corruptus libere hærebat, uti etiam aliquid sibi simile in ipsius vaginæ cavitate fœde permanebat.

Hæc sunt, quæ naturæ observatione digna reperimus, itaque ex hoc ipso naturæ lusu nimia admiratione affecti cætera omnia reliquimus.

## OBSERVATIO II.

**V** Illica ad rusticas operas  
quam apta, atque ipsis laboribus  
suffulta, temperamenti  
ad

ad frigidum, & siccum tendentis, postquam ad nuptias debita ætate, ac corporis plenitudine, & extensione devenit, quam feliciter varios filios suo tempore peperit, videlicet in primo partu unam tantummodo prolem; in secundo duos satis vegetos, ac pleno corpore efformatos foetus; in tertio iterum duos pariter vegetos feliciter in lucem edidit; in quarto tres debito tempore, ac feliciter æqua magnitudine donatos edidit, absque sensibili corporis incommodo, si excipias tempus graviditatis, & nimiam musculorum abdominis, integumentorumque, ac uteri distentionem; in quinto demum duos filios peperit; ac in sexto

sexto unum solummodo ; Tandem in septimo pro vero partu, molas nonnullas sarcomatosas diversæ magnitudinis reddidit, ac nonnullæ has inter intus fuere aquositatis plenæ, videlicet tenacis lymphæ, viscosioris aliquæ, aliæ vero tenuioris consistentiæ. Post hæc omnia cum jam ad ætatem maturam pervenisset usque ad annos XLIII., cœperunt catamenia parcè, ac tenuiter fluere, quæ ab anno XIV. usque ad illud tempus satis large, ac rubicundè fluxerant: sequenti vero tempore cœpit laborare morbo cum decolori facie, & totius corporis emaciatione, nec non sensu tumoris vagante in ipsamet abdominis cavitate

tate huc, illuc eundo, ac redeundo juxta situm, & positionem corporis in cubili servatum, semperque castra sua servando juxta propriam gravitatem. In hoc rerum statu catamenia prorsus evanuerunt, spatio a primo morbi intuitu quinque mensium circiter, ac alvus quam pertinacissime, uti etiam per totum vitæ cursum sicca facta est, ac permansit, paulatimque totum reliquum corpus ad summam emaciationem devenit. Hic vero abdominis tumor cursu temporis ad majorem extensionem est perductus in superiore parte; nam ex ima abdominis provenire satis, superque manifestum fuit, & paulisper imperium firma-

ma-



mavit in toto abdomine , cum  
 contumaci pedum tumore, & u-  
 rina minore, colorataque, ac spe-  
 ciatim fluctuantes materiæ in re-  
 gione umbilicali, & Ipogastrica  
 tactu deprehendebantur , ita ut  
 nonnulli pro vera ascite habue-  
 rint; sed attento examine in tan-  
 genda regione Epigastrica pate-  
 fiebant variæ, ac diversimodè di-  
 spositæ circumscriptæ partes duræ,  
 ex quibus Medici, ac Chirurghi,  
 qui etiam pro curiositate adfue-  
 runt, varium ambiguumque judi-  
 cium de hoc morbo ferrent: La-  
 bentibus vero mensibus, accessit  
 pertinax Dyspnea, & abdomen  
 magis, ac magis intumuit usque  
 ad nimiam, deformemque preter-  
 natu-

naturalem extensionem, ut videre licet in T. 1., ita ut vulgarem amplitudinem dimidio plus excederet, & pendulum super crura jaceret. In hoc rerum statu naturalis appetitus permanebat cum aliquantula præternaturali fiti recurrente, & speciatiim matutinis horis; at vero pulsus numquam fuit febrilis, ut mihimet retulerunt plures Chirurghi, & somnus aliquantisper placatus fere semper permanfit; sed ob molestissimum abdominis pondus, extremitates inferiores magis tumidæ, seu oedematosæ, & hinc inde copiosissimis Varicibus conspersæ apparuere, & vacillantes evaserunt, ut etiam naturæ vires:

Bre-

33

Breviter dicam, corpus ipsum in-  
 star ambulantis sceleti, seu ossium  
 compagis movebatur. Magna illi  
 inerat appetitus privatio cum sum-  
 ma virium lassitudine, & aliquo-  
 ties corporis jactatione, ac lan-  
 guore. Cum autem eo esset cor-  
 poris habitu, gerendo res aliquas  
 domesticas per domum, & circa  
 domum monstruosè obambulando,  
 præter ulteriorem abdominis tu-  
 mefactionem, externè circumcirca  
 Herpeticæ miliares in Umbilico  
 pustulæ apparuere, (a) ex qui-  
 bus copiosa feri quantitas conti-  
 nenter promanabat, absque oe-  
 conomiæ utilitate; Et sic miser-  
 rimè, ac labiorosè vitam transe-  
 git

C

(a) V. **T** 1. BB.

git obambulando per quatuor annos, & ultra.

In hoc tam vario temporis spatio, varii admodum medici, ac chirurgi ad eam invisendam, etiam libenti animo, ut ego ipse, interfuere; sed fere solo diligentissimi chirurgi Francisci Chiusdinensi consilio, varia Diuretica, nec non admodum diversa lenientia interpolatim usurpare in frequenti usu habuit, absque ullo alio auxilio.

Tandem ob summam naturæ virium & corporis lassitudinem in Lecto firmiter fixa jacens per quatuor circiter menses, nec non atrophia superiorum maxime annexarum partium consumpta, ca-

clami-

lamitose, mente tamen integra,  
ac firmo spiritu, sponte requisitis,  
& acceptis sacrosantis Ecclesiæ  
actibus, miserrimè requievit die  
XXVI. Aprilis MDCCLXVI.

Ex hac perrara morbi historia  
ad cadaveris sectionem avide cum  
fociis, & amicis me transtuli;  
ac primo diligenter filo circum-  
ducto mensuram extensionis ipsi-  
usmet abdominis exploravimus,  
quæ fuit supra tertiæ partis eju-  
sdem totius corporis extentionem.  
Postea vero ad abdominis sectio-  
nem devenimus, & dejectis inte-  
gumentis, oculis perlustrantes pro-  
prios ejusdem abdominis muscu-  
los, graciliores, & laxiores red-  
ditos fuisse, ac per quam exiles  
com-

esse animadvertimus. Peritoneum vero per quam extensum, ac validius redditum, & substantiæ crassioris: Inde peritoneum introspectantibus apparuit tumor folliculatus, qui anteriore parte cellularis membranæ ope strictè cohærebat, a Chirurgis struma dictus, in quatuor partes divisus, (a) ac communi folliculo circumdatus, quarum pars superior, una cum sinistra, & dextera varios, & admodum diversos folliculos ejusdem speciei, ut videre est in T. II. NN. perinde ac si tales folliculi fuissent fere in fundo undequaque tumoris, diversæ magnitudinis, & consistentiæ: & horum aliqui

(a) V. T. III. F. I. NN.

liqui materiam fusam continebant, alii tamquam sebo replicatam, alii albumini ovi similes erant, & alii melli simplici ferventi, vel decocto granorum coffe saturato satis superque diversimode replicati comparuere: ex quibus satis patuit diversam horum mollitiem, & tenacitatem non ex alio fieri, quam ex varia ejusdem materie coadunatione, & consistentia: Hi omnes folliculi firmiter connexi evadebant ope cellularis membranę, & alicujus fibrę carnosę seu muscularis invicem intertextę, in quorum interstitiis varia admodum vasa arteriosa, & venosa exilissima intertexta erant; ex quibus probabiliter omnes simul comprehensi

henſi folliculi vitam, & augmentum traxere. Inferior vero pars in tota regione umbilicali firmiter fixa, & aliis connexa folliculis hærebat, imperiumque obtinebat; quam ampliſſima vero ſuperius poſita (a), materie virulentæ repleta, erat ſimilis partim ſaturatæ decoctioni granorum coſſæ, & partim melli ſimplici, variæ conſiſtentiæ, & glutinoſitatis: huiusce materie pondus ad XL. circiter libras aſcendebat; & proprius ejus, quamvis cum aliis præcitatis, communis folliculus quam craſſus erat, & tractû tractû fere ſubſtantiæ cartilagineæ. Hic magnus tumor intus in parte ſi-

ni-

(a) V. T. II. 0000.



nistra alium divisum folliculum continebat, cum ipsomet magno folliculo intertextum albumini ovi simili materia repletum. Similiter non dissimilis alius hærebat in parte superiori, fere in medio supradictæ partis lateralis totius tumoris, ut clarius patet in T. III. F. I. L. Q. Hic amplissimus folliculus in parte superiori, & media quem arctissimè adhebat esterne omenti extremitati; & quoniam partes hujusce tumoris superiores proprium imperium habebant sub magno ipsius colon arcu, etiam hoc in loco pluribus locis conjunctus erat cum ipsomet colon, ut videre licet in T. II. L. IIII. In inferiore vero parte fini-

fra ita connexus erat cum ipsamet Tuba Falloppiana sinistra, & muliebri testiculo, ut ne summa quidem cultri diligentia dividi posset, & muliebris testiculus speciatim, vix quidem aliquid vestigii monstrabat, absque ovis circumscriptus. In dextera parte vero alter muliebris testiculus (a) liber, ac divisus cum ipsamet tuba manebat, sed cum ovis scirrhosis redditus, & mole auctus. Tandem hic idem magnus, ac communis folliculus, vasa arteriosa, & venosa communia ex mesocolon habebat, illo in loco, quo colon supra os Ileon finistrum incurvatur in Intestini Recti gratiam. Inter hæc sanguiflua  
vascu-

(a) V. T. III. F. I. GG.

vascula prædicta non pauca etiam adveniebant ex ipsomet mesorecto vertebrae lumbales versus, & ex spermaticis speciatim sinistris, nec non ex lato tubæ ligamento, quod ex similitudine alæ vespertilionis ab anatomicis vespertilio, seu latum nuncupatur. Ablato ex abdomine supradicto tumore, in lucem evenerunt intestina aliquantisper inflammata, & speciatim Ileon intestinum, quod totum sub magno folliculo hærebat cum reliquis omnibus Intestinis, ac cum quadam parte ipsius colon in magnæ curvaturæ tractu, & cum omento. Mesenterii vero Glandulæ auctiores comparuere, & fere ad scirrhusitatem translatae, ex quibus tran-

transverse percurrentia quædam vasa lymphatica patentiora vidimus cisternam versus directa. Jecur vero naturalis molis, & substantiæ erat; sed bilis ipsa in cystide collecta, subtilior, & dilutior facta erat, & color ejus ad clarum vergebat. Lien vero in statu naturali comparuit, uti etiam Pancreas.

Post hæc omnia ad uteri, & vaginæ sectionem devenimus, ac in interiore ejusdem vaginæ facie columnam unam perspeximus ipsiusmet hymenis adhuc integram esse, nec non validiorem, & ampliorem factam: quod vero spectat ad vaginæ substantiam, quam naturalis erat, sed nimis laxa,  
ru-

rugosior, & summa resistantiæ. Uteri vero substantia, & magnitudo quam naturalis, si fundum excipias, qui in parte sinistra amplior redactus erat. Tubæ vero, ipsarumque fimbriarum ejusdem partis vix ullum vestigium erat, ob summam cohærentiam cum ipsomet magno folliculo: ejusdem uteri cavitas vero amplior redacta comparuit, & in aliquibus fimbriis tubæ dexteræ parvæ idatides nonnullæ manifestè comparuere, uti etiam in tractu rotundi ligamenti sinistræ partis.

Hæc sunt, quæ solummodo observatione digna mihi videbantur.

Hic vero tumor, seu potius  
*stru-*

*struma*, utrum ad ipsum muliebrem testiculum, suamet propria origine, pertineat, an vero pertineat ad proprias glandulas lumbales, an ad ipsas mesocoli glandulas, aut mesenterii, non satis intelligo: id unum adiiciam, ad primam classem potius referri quam verisimillimum esse ex ipso met alterius muliebris testiculi scirrhuso ovarum statu, & fere ex summa sinistri muliebris testiculi abolitione; & revera non desunt apud eruditos observata non multum dissimilia, & ab ipsis practicis auctoribus nobis tradita, & speciatim nuper ab eruditiss. Alberto Haller in suis disputationibus ad morborum historiam, & cu-

& curationem facientibus T. IV.  
 de stupendo abdominis tumore  
 §. V. p. 447. &c. Verum si cu-  
 pis b. l. videre qua ratione, &  
 quomodo in mulieribus hujus-  
 modi tumores fieri possint, ne  
 ultra propositas leges longus sim,  
 lege prædictum Albertum Haller  
 l. c. §. XI., & XII. p. 460.

### OBSERVATIO III.

**F**lorida virgo Annorum XIII.  
 circiter, temperamenti ad  
 siccum tendentis, & raræ consti-  
 tutionis, postquam per duos an-  
 nos successive difficilis respiratio-  
 nis morbo laborasset, cui febres  
 irregulares superveniebant, & per-  
 du-

durabant per quinque, aut septem dies, una semper cum orthopnea, seu potius fere catarrho suffocativo, (a) tandem hæc omnia recurrendo cum ventris torminibus, & corporis habitu jam facto cachectico, quamvis diversimode a variis medicis curata, inopinanter a catharrho suffocativo perculsa, una cum pulsu exilissimo, & superiori respiratione, ad superos evasit XXVI. Dicemb. MDCCLX.

In cadaveris sectione totam interioris sui pectoris partem, ac structuram oculis perlustravimus, una cum totis visceribus, & vidimus nonnullas bronchiales glandu-

(a) V. cl. Etmullerus Prax. L. I. T. II. S. XIV. c. III; art. IV. p. 215.



dulas scirrhasas radditas, nec non auctiores, speciatim illo in loco biforationis ipsiusmet tracheæ, in quo specialiter una magnitudinis majoris quam ovi Gallinacei erat distenta, & sepulta in ipsamet tracheæ cavitate, ita ut nonnulli semicirculi cartilaginei tracheæ illo in loco contusi, ac fracti essent ex summa illius glandulæ compressione facta, & ipsi tracheæ parietes interni ad summas angustias redacti, uti etiam trachea in sui biforcatione fere foramine carebat (a). Pulmo ipse in ambabus pectoris cavitatibus quam inflammatus inventus fuit; & cor spe-

(b) V. Giorg. Baglivi Prax. Med.

speciatim in ventriculo dextero, auricula, & venæ cavæ sinu, undequaque prolatum erat, & per quam flaccidissimum. Abdomine vero adapercto, nonnullos teretes vermes glomere collectos in jejuno intestino inesse aperte vidimus; & reliqua omnia in statu naturali constituta satis superque comparuerunt: nervorum systema vero quam flacidum, & laxæ constitutionis. Tandem totus sanguis in propriis vasibus collectus, & ut in communi est speciatim in venis, decolor erat, & suos grumos, seu Polypos in quiete efformatos (a) circa precordia, fere nullius confici-

(a) V. Andrea Pasta negl' Atti Carogera T. 30. e 31. De cordis Polypo dubium revocato.

sistentiæ esse, & per quam raræ constitutionis perspeximus.

## OBSERVATIO IV.

**F**lorida mulier robustæ constitutionis, & laboribus dedita XXV. suæ ætatis anno ad nuptias ingressa, lento, sed contumaci capitis dolore laborabat cum frigoris sensu in interiore capitis parte usque ad tempus primæ periodicæ purgationis, quod fuit anno suæ ætatis XVII. Suo primo graviditatis tempore, summo cruciatu dolor eò pervenit, ut tumultuosum delirium inferret absque febre, sed cum pulsum inertia summa, & exilitate, ac non raro cum recurrentibus, dirisque hysteri-  
stericis passionibus, speciatim in

D

cor-

corporis parte dextera : Tamen Paregoricorum ope, & parcis, repetitisque sanguinis missionibus, aliquanto feliciorē vitam ducebat, ac commode fœtum gestavit, & debito tempore peperit, nec non in pristinum statum rediit, si excipias crudum frigoris sensum in anteriore capitis parte. Itaque prospere repetens sua munia, posteriore anno denuo ad novam gestationem transiit, iterumque per totum graviditatis cursum prædicta symptomata crudelia comparuere, quæ post partum desinebant non tamen sublato supradicto frigoris sensu. Deinceps vero per undecim fere annos ita se habendo, quatuor filios

lios procerosi corporis fortunatè peperit , semper cum prædictis crudelibus symptomatibus . Tandem cecidit in frequentiores , ac crudeliores convulsiones , magisque patentes in dextera corporis parte , ac catemenia , quæ usque adhuc , ac congrui profluxerant , abierunt ætatis suæ XXXVI anno . Itaque crudelibus convulsionibus , & aliquoties acri delirio vexata nullum ex variis medicamentis levamen capiebat , quæ a compluribus medicis adhibita fuerunt : Quin diræ convulsiones sæpe sæpius per diem , & ferinum delirium recurrebant cum tensis hypocondriis , alvi segnitie , ut plurimum sufficientibus aquosis urinis

D 2                      & a-

& aliquoties Jumentosis redditus, nec non patenti Timpanitide, & siti. Toto hoc prædicto suæ vitæ tempore appetitus semper, ac constanter præsto fuit, uti etiam naturæ vires. Tandem vero auctis, ac frequentius male habentibus totum corpus convulsionibus, miserrimè vitam cum morte commutavit ætatis suæ XXXIX.

Postridie autem ad cadaveris sectionem deveni; & quoniam omnia symptomata ex partium capitis affectione prodierunt, ideo a capitis sectione initium fecimus. Detractis capitis integumentis; pericranium, & ipsum cranium oculis perlustravi, omniaque in statu naturali constituta cognovi; cranium

nium vero ipsum in interna sui parte, ac in tractu futuræ sagittalis, varias habere vidi, ac dissimiles præternaturales excavationes ex variis pisiformis tuberculis in ipsamet duræ-matris externa superficiei existentibus procreatas, ipsumque sinum, una cum aliis ipsius cranii varicosum factum, abundantique sanguine grumefacto repletum, uti etiam varias venas in illud se ingerentes. Ablata dura-matre, piam inspexi, turgidis vasis nimio sanguine repletam; ast aracnoideam membranam cum ipsamet substantia corticali, ac medullari ipsius cerebri, ac cerebelli nec non plessu coroideo in statu naturali constitutam esse satis apertè patuit. Verum e-

nim vero pars anterior sinistra  
 ipsiusmet cerebri aliquatenus ad  
 maiorem magnitudinem redacta  
 exterius videbatur: & revera toto  
 cerebro horizontaliter diviso juxta  
 suos ventriculos, tumor in ipso-  
 met ventriculo sinistro follicola-  
 tus comparuit, materiæ glutino-  
 sæ, flavescentisque repletus, &  
 fere non dissimilis albumini o-  
 vi, ipseque folliculus flacci-  
 dissimus erat, nam quam fa-  
 cillimè ex sola ipsiusmet cere-  
 bri compressione est ruptus. Tu-  
 mor hic pro maxima sui parte ine-  
 rat potius in anteriore ipsius  
 ventriculi portione, & reliqua  
 sui parte totum fere ventricu-  
 lum



55  
lum pervadebat usque ad ipsum  
Ippocampum subiacens (a).

Deinde vero adaperto thorace  
pleuram, & diaphragma inspexi,  
in quorum parte dextera, nonnul-  
læ scirrhusæ protuberantiæ, vel  
substantiæ sibi similes circumspersæ  
cum variis idatidibus hinc in-  
de positis aperte comparuere; &  
ipse pulmo inflammatus erat, ac  
extrema sui parte inferiori, nec  
non dextera adherens ipsimet dia-  
phragmati tractu circiter pollicis  
uno comparuit: similiter in ipsa  
pleura dextera serum è propriis

D 4 va

(a) Admodum curiosa est historia Valsalvæ a cl.  
Joanne Baptista Morgagno nobis enucleat. V. de se-  
sedibus, & causis morbor. per anatomen indagatis. E-  
pist. 1. T. 1. §. 6. p. 6. Et non dissimiles aliæ videri  
possunt in Bonetti sepulcreto L. 1. S. 11. obs. 8. & seq.

vasibus exclusum, ac vagans inesse vidimus; ponderis circiter librarum quinque. In interiori ipsius pulmonis substantia glandulas bronchiales pro majori sui parte auctas fuisse satis animadverti, nonnullæque cultro divisæ duriores comparuere. Alteram vero pulmonis partem in proprio suo statu naturali constitutam esse patuit, uti etiam cor, & omnia vasa sanguiflua præcordialia, si excipias nonnullum polypum in ventriculis ipsiusmet cordis præsistentem, & reliquum sanguinem magis solutum, ac fluidum.

Abdomine recluso, jecur vidimus substantiæ, ac molis naturalis, uti etiam conclusam bilem  
in

in cystifellea; sed ejusdemet lobus ventriculo subiācens aliquatenus inflammatus videbatur. Lien vero, ventriculus, pancreas, omentum, intestina, mesenterium ejusque glandulæ, renes, veslica urinaria, uterus, muliebres testiculi &c. ad statum naturalem constituta esse satis patuit. Tandem vero observatione mihi dignum visum fuit systhema musculare, quod quam gracile totum comparuit, & facillimè, etiam parvis viribus lacerabile: membranam vero cellularem, seu magis adiposam quam divitem esse propriæ suæ materiæ oleosæ, seu potius sebaceæ, aperte intuenti constabat.

OB-

## OBSERVATIO V.

**V** Ir ad cachecticum tendens, olim Galliæ Provinciæ miles, quadraginta fere annos natus, postquam Pforam, seu scabiem caninam per plures menses toleravit hyberno tempore, & sine præcedente ulla corporis præparatione, & consilio, nescio, quo medicamentorum usu, liber evasit, ac paullo post incidit in febrem inflammatoriam cum summa respirandi angustia, atque astantium, ac vicinorum pietate in hoc Regium Senarum Nosocomium asportatus fuit. Hunc statim ego ipse pervidi, & ferali Peri-

Peripneummonia cum frequentibus lypotimiis, pulsuque molli, & convulso laborare eum inveni, statimque sanguinem repetitis vicibus per diem detrahendum curavi, & paregorica præscripsi, ac noctu senapismos cruribus apponendos statui; sed incassum omnia adhibita fuisse; Nam cum naturæ vires plurimum, etiam in principio debilitatæ essent, quam cito sacrosanctis Ecclesiæ actibus æger munitus fuit; & revera inopinanter secunda morbi die vitam cum morte anxie commutavit. (a) No-

(a) In coacis habemus -- Quod si totus pulmo una cum corde inflammetur, ut in latus procidat, resolvetur totus æger, jacetque frigidus, & sensus expers.

Notandum vero ægrum hunc hisce duabus suæ afflictæ vitæ diebus, aphonum semper fuisse absque patenti guturis inflammatione, & externo tumore, & totis viribus obersistentem enema præscriptum numquam recipere voluisse.

Altera die in perficienda hujusce cadaveris sectione, in externa abdominis parte, ac regione hypocondriorum dextera, tumorem circumscriptum, magnitudine ovi Gallinacei aspeximus, atque adaperitum, respondentem vidimus portioni cavæ, seu inferiori.

pers : Moritur autem secundum, aut tertium diem agens: si autem sine corde contigerit, idque minus; ferius vitam finiunt, & quidam evadunt. — V. cl. Duretus c. XXI. §. 32. p. 276. & cl. Verna de Pleuritide P. 3. c. IX. p. 77. 78.

ri ipsius jecoris, & ex omenti exclusione efformatum esse absque peritoneo circumcingente, & cum aliquibus glandulis ipsiusmet omenti supra modum auctis: Ex qua omentali Hernia coniiicere nobis licuit, aliquot ante annis hoc in loco vulnus eum accepisse longitudine fere duorum pollicum, uti revera ex diligenti externorum integumentorum examine cicatricem animadvertimus; Unde prædictam Herniam originem habuisse ex inconvenienti curantis Chirurghi efformata futura statuimus (a). Deinde

(a) V. Laurent. Heysterus Chirurg. L. I. c. V. p. 100. &c. V. Traité des opérations de Chirurgie Par M. René -- Jacques croissant de Garengoet. T. 1. de la Gâstroraphie Article 1. p. 178. &c.

inde vero alius externus multo minor tumor nobis comparuit sub hypocondrio sinistro, nempe sub lienis positione, qui tumor nil aliud fuit, quam cicatrix adhuc adaperta, cujus parietibus ipsum intestinum colon firmè adhærebat cum parte sua superiore, atque ipsius ani commodè ex hac parte vicem gerebat. Et revera ex ipsamet sectione veritatem hanc patefecimus: Nam partem inferiorem ipsius intestini colon maximè corrugatam esse, ac planè vacuum, quippe quæ solum mucum intestinale contineret, ideoque suo muneri pene ineptam esse, ex tota ejus divisione satis patuit. Postea vero jecur ipsum  
con-



conspeximus, ac in statu naturali constitutum vidimus, sed ad molem aliquanto majorem redactum, nec non in ipsa ejusdem jecoris cystifellea bilis dilutior nobis comparuit, ac in ejus cavo, duo calculi, glandis magnitudine inerant. Lien vero supramodum auctus erat, & per quam scirrhusus, uti etiam ipsum pancreas. Ad aperto thorace, pulmonem speciatim sinistrum equabiliter quam inflammatum, turgidumque, & ad maximam resistantiam fere ipso hepatis similem adductum inspeximus (a), in  
cu-

(a) V. cl. Joann. Bapt. Morgagni de sedib., ac causis morb. per Anat. indagatis L. II. Epist. XXI. §. 23. 27. 28. Et cl. Frid. Hoffmannus Med. ration. syst.

cujus parte dextera fluitans, flavumque serum in pleuræ capacitatem supra libras sex innatabat. Dissecto pericardio, cor ipsum perlustravimus aliquatenus mole auctum, & ubique materia mucoso-flavescente cum forti adhæsione coopertum, & fere purem referente, nec non idem cor summe inflammatum, & in externa superficie ubique fere papillatum comparuit: Per longum vero eodem corde cultro diviso, in suis ventriculis sanguinem vidimus ad nigredinem vergentem, & quammaximè solutum, nec non abundan-

syll. T. IV. P. I. S. II. C. VI. in qua ait §. XII. — In sectione pulmones inveniuntur inflati duri, instar hepatis, & aquæ fundum petentes &c.

danti copia in auricula, & ventriculo ipsiusmet cordis dextero coacervatum.

## OBSERVATIO VI.

**V** Ir procerus, professione Lanius, habitu corporis quam robusto, ac pleno, nec non laboribus, herculeisque viribus dedito, annos quinquaginta circiter natus, quatuor ab hinc annis cœpit cordis palpitationibus laborare, & ferali Hæmoptifi, quibus non raro fluxus hæmorrhoidalis accessit. Sed omnia feliciter evanuerunt Medicis artificiis, nempe summa corporis quiete, Dieta, nec non parvis, ac repetitis

E                      fan-

sanguinis missionibus. Verum enim vero post duos annos cecidit in ferum anasarca, ex quo pariter feliciter evasit aptorum remedium usu, & paullo post iterum incidit in cordis palpitatio-  
 nes, & novam hæmoptisim tam crudelem, ut corpus movere, & incedere vix quidem posset; Ita-  
 que brevi temporis spatio ad sum-  
 mam cachexiam transiit cum sum-  
 ma totius corporis laxitate coniun-  
 ctam, viribusque naturæ prostra-  
 tis, ita ut tandem firmiter in le-  
 cto jacere sit coactus cum con-  
 tinua, & lenta febre, & a Do-  
 mesticis denique sit asportatus in  
 hoc Regium Senarum Nosoco-  
 mium, in qua per quindecim  
 dies

dies incassum omnia adhibita fuer-  
re, quamvis summa cautela, at-  
tentione, & cura esset tractatus.  
Tandem vero summè turgidus  
per totum ambitum factus, cum  
sublimi, & laboriosissima respira-  
tione, pulsuque semper, ac co-  
stanter irregulari, nec non con-  
vulso, opportunè sacrosanctis Ec-  
clesiæ actibus præmunitus, inopi-  
nanter, ac stertendo expiravit.

Postera die ad ipsius cadaveris  
sectionem deveni cum amicis, ac  
adaperto thorace, ferum innatans  
& admodum flavescens in amba-  
bus thoracis capacitatibus magna  
copia coadunatum comparuit, sed  
multo magis in parte dextera.  
Ipsam pericardium externè perlu-

stratum, alter fere pulmo, prima fronte, videbatur pro sua excedenti mole: Per cultrum vero adapertum ipsum cor contentum fere dupliciter divisum comparuit, ejusdemque fibræ musculares quam laxæ, & tenuissimæ consistentiæ comparuere: Per longum deinde diviso in suis ventriculis, dexterum vidi nimia capacitate donatum, & sinistrum fere servantem statum naturalem: Ambo ventriculi prædicti turgido sanguine, & soluto, ac fere ad nigredinem vergente repleti erant; & auricula, sinusque venæ cavæ ipsius cordis dextera parte in excessum dilatati comparuere, ita ut aliud cor simul comprehensum videretur.

tur. In hac præternaturali ampla capacitate plures sanguinis grumi in circuli formam dispositi, ac invicem positi inerant, summeque consistentiæ apparebant, in quorum medio prædictus sanguis, turgidus, solutusque innatabat. Valvulæ semilunares arteriæ pulmonaris, & pertinentes ad ipsum dexterum ventriculum prolongatæ aliquatenus erant, & in medio unius non minimus tumor folliculatus manebat, magnitudine nucis avellanæ, & sebacea materia repletus, ac magna ex parte ipsimet cordis ventriculo subiacebat : Similiter in hujusce cavitate, variæ, & dissimiles hidatides comparuere usque ad duodecim, speciatim cir-

ca columnas, aut lacertos ipsius cordis, & valvularum tricuspidalium, & hæ ipsæ valvulæ quam prolongatę erant. (a) Ipsum pulmonem in statu naturali satis comparuit, & solummodo intus in parte sinistra ulcus animadvertimus per pollicis tertię partis tractum in ipsamet substantia membranosa bronchiali serpens, & glandulas similiter bronchiales circumstantes aliquatenus auctas: In perlustrando ulcere, syphonis, & aeris ope, aerem libere protrudi vidimus per duos sinus in aliquas aereas pulmonis vesiculas, quibus postea cultro divisis, pus inesse patuit.

### Abdo-

(a) V. Joan. Bapt. Morgagni l. c. T. I. L. II. Epist. XVII., & XVIII. V. cl. Joan. M. Lancisi de subitaneis mortibus. Obs.



Abdomine recluso, jecur conspeximus aliqua magnitudine ubique auctum, sed maxime decoloratum. Ventriculus vero nimie capacitatis erat, & fere supra dimidium. Omentum vero quam pingue cum aliquibus venis varicosis. In mesenterio varices abundantissimæ fuere, uti etiam in mesocolon, & mesorecto: Ipsamet vena cava ascendens, quam amplissima videbatur, & sanguine fere nigro repleta; sed supramodum admirabilis fuit vena porta, quæ magnitudine ipsam fere venam cavam æquabat, & omnes ejus propagines varicosas esse aspeximus. Lien vero aliquatenus tumefactus comparuit; & reliqua omnia ad statum naturalem quam-

maximè accedebant. Tandem ambitus corporis quam candidus, & laxè constructus erat, cum contra in statu naturali potius torosus fuisset, & subobscurus.

## OBSERVATIO VII.

**V**iator quidam Neapolitanus, Annorum circiter quadraginta, temperamenti ad cachexiam tendentis, & pleni habitus, ob summam virium laxitatem, ac prostrationem cum febre, nec non hypocondriorum, Lumborumque dolore, ac tussi sicca, & difficili respiratione receptus est inter ægrotantes hujusce Senarum Nosocomii: dicebat autem se tempore

vitæ suæ obnoxium fuisse hæmorrhoidali fluxui periodicè recurrenti post binos menses; sed jam per duos periodos artis præsidio liber evasit: Nam ob summam hæmorrhoidalem evacuationem in ultima periodo, ad spiritus Vitrioli usum externè, & internè, Chirurgi consilio se contulit, cujus ope quam cito convaluit; at paulatim incidit in difficilem respirationem, & lumborum dolorem, nec non appetitus deficientiam, quibus tandem erratica febris accessit, podicis dolor cum aliquantulo hæmorrhoidali sanguine profluente, nec non recurrentes cordis palpitationes. In curatione hujusce morbi emollientia adhibi-

ta

ta fuere, blanda emmenagoga,  
 & parvæ, sed repetitæ sanguinis  
 emissiones, etiam cum sanguiſugis  
 ad venas hæmorrhoidales applici-  
 tis; ſed labente tempore omnia  
 in pejus ruere cœperunt: Nam  
 cruda, ac feralis tuſſis acceſſit  
 cum frequentioribus cordis palpi-  
 tationibus, nec non exacerbatio-  
 nibus noctis tempore, cum ſubſe-  
 quentibus, & particularibus ſym-  
 ptomaticis ſudoribus, ac laborio-  
 ſiſſima reſpiratione, cum pulſu  
 parvo, & aliquoties intermittente;  
 atque ita laborioſiſſimè perduran-  
 do per menſem circiter cum ſum-  
 ma naturæ virium proſtratione,  
 & pectoris ſtertore, tandem po-  
 ſtquam aſtonia duos dies laboraſ-  
 ſet,

set, jam sacrosanctis Ecclesiæ actibus præmunitus occubuit.

Postridie autem, curiosius pro inquirenda hujusce morbi, ac mortis causa, ad sectionem devenimus: ac primum dissecto thorace, magnam feri copiam in ambabus pleuræ cavitatibus inveni, ipsasquemet partes musculosas laxiores, ac molliores esse satis, superque conspeximus. Pulmo totus vero undique coopertus mucosa materia apparuit ad quatuor fere linearum crassitudinem, & speciatim in ipsiusmet extremis, usque ad sex. Quædam hujusce materiæ quantitas in ferventem aquam injecta, numquam ad solutionem devenit, sed potius in  
se

se ipsa concrevit, & durior evasit, ac aqua ipsa in eadem claritate permanfit. Similiter aliam æqualem quantitatem in aquam simplicem e Puteo extractam immisi, ac multum permiscui, eodemque ipso tempore turbidam fieri pervidi concreta materia super imposita fere ad fundum subfidente: sic omnia in vase vitreo ingesta ad modicum ignis colorem apposui, ac retinui usque ad summum hujusce mixtionis æstum: Quo facto materiam ipsam fere ad nihilum transivisse animadverti, & quò æstuosior evadebat aqua, eò magis solubilem fieri materiam, & per aquæ particulas ita dissolvi, ut opacitatem æquali-

bilem per ipsam massam induxerit. Similiter aliam quamdam portiunculam prædictæ materie super ardentem ignem imposui, statimque foetentem sensi, fere empirumatico cum odore ipsimet puri, ac virulentia non dissimili (a). Sed ut redeam, unde discessi, Pulmo ipse per bronchiales suas cavitates, ac ipsammet asperam-arteriam foetente humore in purem converso fere undique repletus comparuit. Ipsum pericardium externè pervidi ad nimiam molem pervenisse, quo per cultrum dissecto, magnam flavescentis feri deprehendi portionem, & ipsius  
cor-

(a) V. Antonius de Haen. Ratio Medendi P. II.  
C. II. Et cl. Sauvages de Inflammat.

cordis fere duplam magnitudinem. Hujusce auricula dextera, una cum venæ cavæ sinu capacitatem duplo majorem habebat, quam intus continere, una cum ambabus ipsius cordis ventriculis, atrum, nigrumque sanguinem, ac vix grumefactum inveni; Dexter autem ventriculus quam amplificatus, si-ve capacitae auctus comparuit, ipsamque parietum substantiam laxiorem esse satis vidimus. Sinistrum vero ventriculum, quamvis ex ipsomet grumefacto sanguine repletum, adhuc esse in statu naturali nobis patuit, si excipias præternaturalem parietum laxitatem. Valvulæ quidem tricuspidales ipsiusmet dexteri cordis ventri-



tricoli quam prolungatæ fuere ,  
 uti etiam ipsæ respondentes co-  
 lumnæ , seu lacerti . Interim in  
 perlustrandis semilunaribus arteriæ  
 aortæ , unam vidi cum jam sup-  
 purato tumore non multum am-  
 plo , & ori ipsius aortæ respon-  
 dente : In aliis vero duabus val-  
 vulis , fere in medio , ac basi u-  
 nius , pisiformis tumor , gypsea  
 materia repletus inhærebat , ac  
 proprio folliculo coercitus . Dein-  
 de vero dissecto abdomine , jecur  
 nimix molis comparuit , & fere  
 supra tertiam partem æquabiliter  
 auctum ; In sua cystifællea bilis  
 abundantior inhærebat , sed nimis  
 mucillaginea , & ad viridem co-  
 lorem tendens . Tunica externa  
 ipsius

ipsius jecoris e peritoneo prove-  
 niens, nimiae consistentiae erat,  
 crassior, ac albicantior. Truncus  
 ipse venae cavae adscendens, spe-  
 ciatim in tractu ipsius jecoris, ac  
 Diaphragmatis perforatione, seu  
 transitu, quam amplificatus, seu  
 summè varicosus æquabiliter erat.  
 Lien vero fere duplus videbatur,  
 & per quam laxissimus in sub-  
 stantia comparuit. Ventriculus in  
 statu naturali mihi visus fuit. O-  
 mentum vero quam consumptum e-  
 rat, & totum ventriculum versus  
 coercitum. Mesenterium, ejusque  
 glandulae in statu naturali erant,  
 uti etiam pancreas. Verum enim  
 vero totus truncus, ac directio  
 venae portae, una cum lienaribus,  
 me-

mesentericis, Epiploicis &c. venis, ac propaginibus maximè dilatata erant, omniaque varicosa videbantur. Tandem totum corpus quamvis externe rite constructum, auctumque cum summa partium proportionem, quam flaccidissimum erat, speciatim totum systema musculare; Et ipse panniculus adiposus non admodum erat consumptus, sed ipsa adeps nimis diluta, & parvæ resistentiæ apparuit.

Ex hac historia cum corporis sectione vides B. L. quam anomala symptomata, & morborum concursus comparuere, ob solam imprudenter retropulsam hæmorrhoidalem evacuationem!

F OBSER-

## OBSERVATIO VIII.

**V**irgo annorum decem , & quatuor circiter , pleni habitus , & calidi , ac sicci , ut ajunt , temperamenti , postquam sese in paludosas aquas ad capiendas sanguifugas pluries demersit , coepit putrida febre continua laborare cum summa corporis laxitudine , capitis dolore , intensa siti , nec non arida lingua , ac pulsu duro acriter urgente ; Propterea eadem ipsa die ad Phlebotomiam ex brachio deveni , qui sanguis detractus expers serosæ partis , & summà vividus postera die fuit cognitus. Febris vero cum præ-

prædictis symptomatibus deinceps  
 incalescebat, eoque aliam sanguinis  
 missionem ex alio brachio iteravi,  
 & denuo altera die perlustratus  
 sanguis, æquabiliter obductus  
 crusta alba, tenacique fuit inventus.  
 Ad sitis usum aquam hordei  
 dilutam, aliquantisper acidulatam  
 præscripsi: Tamen anxietas, sitis,  
 & ipse febris impetus ad summum  
 devenerunt. Quarta vero morbi die,  
 exanthemata intensi rubri coloris  
 per ambitum apparuere, & abdomen  
 aliquantisper ad tympanitidem transiit  
 cum hypocondriorum suspensione,  
 alvique mollitie, cum bile vitellina,  
 ac acri. Itaque virgo doloribus  
 undique circumventa, noctem

insomnem duxit, cruciatibusque  
 plenam. Quinta vero die exan-  
 themata patentiora fuerunt, pul-  
 susque elevatiores, ac uno verbo,  
 omnia placidiora videbantur: sed  
 sub medietatem hujusce diei, uri-  
 næ ardor absque manifesta causa  
 comparuit, quamvis idem lotium  
 fere ad naturalem statum acce-  
 deret; Hinc urinæ cruciatus dein-  
 de auctior evasit, una cum eadem  
 feбри, quæ denuo summum vigo-  
 rem accepit, una cum alvi segni-  
 tie, & tympanitidis exasperatione;  
 Unde coactus fui ad enematum  
 usum confugere. Septima autem  
 die febris recrudit cum prædictis  
 symptomatibus, sed pulsus con-  
 stanter elevatiores fuerant, ocu-  
 lique

lique tamquam jubar apparuere, una cum naturali facie, & exanthemata abierunt, ac ambæ Parotides ad præternaturalem tumefactionem quam cito devenerunt, & urinæ ardor, immo pudendarum partium ardor ad summum transiit; Ita ut coactus sim demulcentia, & immediatas cum hordei aqua ablutiones sæpe sæpius per diem adhibere. Octava morbi die tendinum subsultus, oculique splendidiores apparuere, & Delirium postea accessit, una cum majori Parotidum inflammatione, ac tumefactione, nec non alvi segnitie, ac constanti hypocondriorum suspensione. Nona vero die anxie se habuit cum prædi-

etis symptomatibus, & Parotides  
 jam jam ad suppurationem acces-  
 serunt, partesque pudendorum ex-  
 ternæ quam maximè inflammatae  
 comparuere, una cum summo u-  
 rinæ cruciatu. Decima die omnia  
 firmo pede permanserunt, & Pa-  
 rotis sinistra jam ad stabilem sup-  
 purationem transiit: Eadem etiam  
 die Lanceolæ ope illam referavi,  
 magnaque puris pars exivit, cujus  
 ope delirium, & tendinum sub-  
 sultus quievire; sed non ita ac-  
 cidit, quod spectat ad dexteram  
 Parotidem, pudendarumque par-  
 tium inflammationem, ac febris  
 impetum, qui potius magis, ma-  
 gisque invalescebat. Undecima  
 morbi die omnia symptomata in  
 tran-



tranquillitate fuere , si excipias recurrentes vigilias , & anxietates. Duodecima vero die Parotis dextera jam ad perfectam suppurationem pervenit, ut ex fluctuantibus materiis satis patuit; Et quoniam pudendorum labia simul nimium inflammata conspexi , & ad gangrænam producendam quam proximiora , uti ex ipsomet abolito sensu , & cuticulæ separatione apparuit; Parotidis sectionem prætermisi ad sequentem diem; atque illico externis labiis Avicennæ emplastrum , seu potius cataplasma imposui ad vitæ continuationem , & sacrosanctos Ecclesiæ actus ægrotanti adhiberi jussi , quamvis ægra noctem vere satis

quietam duxisset. Decimatertia die summo mane lanceola prædictam suppuratam Parotidem aperui, ex quâ copiose verum Pus effluxit; sed pudendorum labia ad nigredinem potius accedebant, febrisque impetus magis, magisque invalescebat cum pulsu sublimi, ac molliori, nec non oculorum nitore, & bono faciei habitu. Circa finem vero decimæ quartæ diei febris ad placiditatem rediit, una cum præfatis symptomatibus, & ægra noctem duxit multo placidiorem; sed pudendorum labia ad sphacellum, seu fiderationem accessere, & sese confirmarunt. Tandem ut breviter dicam ab hac metipsa decimaquarta die, ad vigesi-

gesimam octavam usque febris placidior perduravit, & ipsæmet Parotides jam apertæ perpetuo vero, & copioso pure manarunt, feliciterque sunt expurgatæ ad firmam, ac stabilem usque cicatricem. Externa vero pudendorum labia, una cum propriis Nymphis naturaliter deciderunt, & volsellæ, seu Forficis ope ab intactis partibus rite separata fuere, & solummodo clitoris, una cum vaginæ sacco intacta, ac integra permansit. Totus hujusce curationis cursus solo, ac simplici communi digestivo cum aliquantula mirrha in pulverem redacta absolutus fuit mensium duorum circiter spatio.

Mira-

Mirabile quidem visu fuit, quod externa pudendorum pars cicatrice plane fuerit obducta, quæ fatis plana, ac lævigata, nec non continua cum perineo, ac podice videbatur, una cum clytoride distincta, superexpressa, & intacta. Ægra vero pristinum intra prædictum temporis spatium, sanitatis, ac floriditatis statum recuperavit, absque ullo alio corporis nocu-mento. Verum enim vero duobus circiter annis feliciter in pristinum floriditatis statum transactis in febrem inflammatoriam incidit, intestinorumque gracilium inflammationem, ex qua tandem, nescio quo fato, vitam cum morte commutavit.

Ex

Ex historia hac, quam tibi offero b. l. magnum naturæ artificium miraberis, cujus sola, ac simplici laudabilissima methodo ægra illa curata, ac feliciter ab orci faucibus ex tam magno morbo erepta est: Quamquam postea alio crudiori morbo cum magna hominum displicentia e vita decessit.

## OBSERVATIO IX.

**M**ulier torosæ constitutionis, Annos fere quinquaginta, & octo nata, temperamenti ad calidum, & siccum tendentis, & ad laborem assueta, quæ suo tempore feliciter, ac legitimè plures  
Fi-

Filios pepererat, coepit molestissimis doloribus laborare in toto abdomine cum hypocondriorum tentione, una cum diris hysterice convulsionibus, & tympanitide, nec non cum febre erratica tertio, & aliquoties quinto quoque die superveniente, ac pudendarum partium albo, seu potius seroso, nimisque foetente, ac pertinaci fluxu, cum earumdem partium ardore, nec non gravi, ac continuo pondere in pelvi regione, absque graviditatis suspitione, externarumque partium exulceratione. Notandum vero, quod plerumque supradictarum symptomatum congeries ex copiosiore prædicto fluxu evanescebat. Post quatuor fere hujusmo-

modi laboriosos menses, quotidiana febris accessit cum manifesto horroris sensu, noctu incalescente, cum continuo partium pudendarum, & uteri cruciatu, ac pondere, ita ut corpus ad summam emaciationem quam cito fuerit perductum.

Ex hac metipsa ad hunc usque locum historia satis, superque patet morbum illum ad uteri exulcerationem referri potuisse, & revera eo nomine morbus ille remediis cum externis, tum internis curatus fuit; sed incassum per tres fere annos a variis medicis domi percurata, tandem ad nosocomium hoc translata fuit, ubi ad summam naturæ virium & corporis

poris imbecillitatem redacta, ac consumpta, quam placidissimè pertractata fuit. Nihilominus vomitus accessit, una cum febre continua, & convulsionibus, quibus fere perpetuo exagitata, peractis Sacrosanctis Ecclesiæ actibus, anxie requievit. mense Octobris MDCCLX.

Postea vero ad cadaveris sectionem deveni; & quoniam ex tota symptomatum caterva, morbi sedes in abdomine, & speciatim uteri parte unanimi consensu credebatur; Ideo ab hac ipsa parte sectionis initium feci. Reclusis igitur integumentis, & musculis carne exutis ipsius abdominis cum peritoneo, in sui anteriore parte  
in



in prospectum venit ipsum Omentum quam maxime consumptum, nec non exulceratum undequaque, ita ut vix pro tertia sui parte conspiceretur, & non minima puris pars intestinis supernatans comparuit quam foetentissima. Jecur vero mole auctum, & substantia aliquantisper immutatum visum fuit, speciatim in lobo anteriori ipsi ventriculo superjacente. Intestina præsertim tenuja, quam turgidissima, & ab aere rarefacto fuere; Et ipsæmet mesenterii glandulæ pro majore sui parte ad scirrhositatem redactæ, & supra modum auctæ, quales etiam fuere lymphaticæ lumbales glandulæ, & aliquantisper ipsum pancreas. Ambo

bo vero muliebres testiculi supra triplum adaucti videbantur, inæquales, & sparsim quamaxime turgiduli, tactuique resistentes, quibus cultro dissectis, fere omnes ovumculos materia alba, & glutinosa, ac fere gypsea repletos aspexi, suosque folliculos hic, illic fere ad cartilagineam substantiam redactos fuisse animadverti. In dextera autem testiculorum parte, præter prædicta, tres seorsim distinctæ hydatides comparuerunt e propria ipsius testiculi substantia prodeuntes, magnitudine supra duplum ovi Gallinacei, cum folliculo minimæ resistantiæ. Uterum vero, quod ad molem attinet, magnitudinem, & substantiam,

tiam, ad naturalem statum accedere satis, superque patuit.

Per longum vero dissecto fœdum ulcus in cervice comparuit, totam internam superficiem comprehendens, absque ulla ipsius vaginæ læsione, uti postea patuit ex diligenti examine, etiam per nitidissima vitrea instrumenta. Ulcus hoc serpens, nigris maculis fere undequaque coopertum videbatur, & aliquantum digitis compressum foetidissimo humore fluxit; Verum in hujus fere medietate, & posteriori congruente ipsius parte, portiunculam gangrenosam adesse ex suamet substantia, profunditate, & scabra superficie, satis patuit. Quod vero tandem

G

nota-

notatu dignum fuit, Cadaver toto externo ambitu consumptum apparuit, & musculares partes quam graciles fuere, nimiaque consistentiæ, & quam cito putrescentes.

## OBSERVATIO X.

**M**ulier quædam fuit fere octogenaria paupercula, habitu corporis macilento, & imbecillo, staturæque mediocris, quæ vili, & exiguo victui assueta vitam ex sola fidelium pietate pluribus ab hinc annis ægerrimè sustentabat. Hæc summa corporis debilitate consumpta, Fidelium subsidio ad Nosocomium hoc Regium

gium Senarum fuit asportata, in quo absque febre sensibili intra mensem propria naturæ lege e vita migravit.

Postridie vero devescto ejus cadavere in Theatrum anatomicum ad perquirendas, & præparandas mulierum partes genitales, studioforum Juvenum causa, in testiculo dextero hujus corporis, & fere in ejus centro inequalis tumor inventus fuit externè albicans, & subdurus, magnitudine major ovo anserino; ac cum folliculo tenacioris texturæ, & hic illic fere ad cartilagineam duritiem redacto. Dissectum hunc folliculum vidi repletum esse glutinosa materia, seu potius unctuosa, atque ad

minima grana seorsim redacta, & equabiliter albescente, in cujus centro magna pilorum quantitas aderat, non dissimilium illis, qui in pube adhuc inerant. (a) Quod vero mirabilius fuit, omnes hi Pili centrum versus reclinati, & fere simul in glomerem circinati comparuere, ut videre est in T. III. F. II. OOOO. Hanc granosam materiam, & fere sebaceam: facile in aqua solubilem fieri cognovi, idque facilius in ferventi aqua, & absque aliquo foetore semper comparuit.

Ex hoc ipso morbo, causa invento, curiosius ad vitæ cursum hujusce mulieris exquirendum sum-

ma

(a) V. cl- Guilhelm. Fabricius Hildanus Cent. V. obs. XLVIII. p. 435.

ma diligentia me contuli, riuoque hominum historiis colligi, mulierem hanc debita ætate, corporisque plenitudine, & statura ad Nuptias devenisse, & per duodecim fere annorum cursum, naturaliter, & quam felicissimè duos solummodo filios peperisse, semperque florentem vitam duxisse; Marito igitur morte prærepto, paulo post illa ad secundas nuptias, transit in quo statu numquam gestavit, & vitam quam miserrimam duxit per sæpe repletam, & fere obrutam animi pathematibus cum crudelissimis hysteriis convulsionibus, & miserabilissimo victu. Verum post decem, & septem annos hic secun-

duſ coniuſ e vita deceſſit ; & ex illo tempore caſte vitam duxit uſque ad ſenectutem , & mortem ; ſed ſæpe ſæpius in ſtatu hoc artritide morbo laboravit , ſummis cruciatibus vexata , ac proprii viſtus neceſſarii defectu anxie perturbata .

Hæc ſunt , quæ ſumma induſtria , & diligentia colligere potui , ut intelligeretur , quod revera ex ipſamet experientia duce , & Celeberrimorum Scriptorum autoritate conſtat , huiusmodi tumores cauſam ducere ex animi pathematibus , & inepto viſtu , ſpeciatim farinoſo , & pultaceo (a) .

Quid

(a) V. Schenchiuſ Obſ. Med. L. IV. de Mulierum vaſis ſpermaticis , & Teſticulariſ Obſ. 2. V. cl.



Quid vero de miris hisce tumoribus sentiant curiosi, dicam cum Paulino (a) — Mihi fatius est discere, quam dicere; — & ut „ nobis innuit Cl. Wan-swie- „ ten (b) sufficit enim Medico „ novisse quid fiat in corpore, „ licet rationem facti non sem- „ per liquido intelligat.

## EXPLI-

V. cl. Tyfon collect. Philosoph. Anglic. n. 2.

V. Horstius L. IV. De Morbis infimi Ventris  
Obs. LIIL.

V. Sennertus L. IV. P. I. S. II. C. XX. ex Joanne Bauchino.

V. cl. Albertus Haller in Disputationibus ad Morborum historiam, & curam facientibus T. IV. p. 477. &c.

(a) V. Ephemer. Naturæ curios. Decas I. Ann. VIII. p. 183.

(b) V. Comm. ad cl. Boerhave §. 1329. T. VIII. p. 219.

## EXPLICATIO TAB. I.

AAAA. **T**otum abdomen ad  
nimiam, ac præ-  
ternaturalem extensionem, nec  
non monstruose redactum.

BB. Herpeticas pustulas circum circa  
umbilicum positas, ex quibus  
continue copiosum serum pro-  
fluebat.

CC. Brachia ad medium fere lume-  
rum dissecta.

DD. Crura ad Genua recta.

## EXPLICATIO TAB. II.

**I**N qua demonstratur totus folli-  
colatus tumor horizontaliter dis-  
sectus, ut magis, ac magis pa-  
teat

teat sua interior substantia, &  
multò diversi interni folliculi  
cohaerenti.

AAAA. Cuticula, cum cute simul  
avulsa, & exterius posita.

BBBB. Panniculus adiposus multò  
consumptus, & fere ad meram  
membranam cellularem redactus.

CCCC Proprii ipsius abdominis mu-  
sculi summe consumpti, & laxi,  
una cum peritoneo.

DD. Crura ad Genua dissecta.

EE Brachia ac fere medium hume-  
rum resecta.

F. Jecur cum vesfica fellea in sua  
naturali positione sub spuriiis  
costis in latere dextero detentum.

G. Ventriculus sub Diaphragmate po-  
situs in latere sinistro, & ali-  
quan-

quantisper sublevatus, ut pateat.  
 g. Ipsum Pancreas subiiciens.

H. Lien in latere sinistro sub costis spuris.

III. Intestinum colon in sua naturali positione huc illuc coalescens cum externo folliculo, & superiori magni tumoris, & reliqua sui portio, una cum aliis intestinis omnes cooperti, & subiacentes ipso tumori erant

LLLL. Totus tumor folliculatus horizontaliter divisus, ut magis pateat interior ejus substantia in variis tot folliculatis tumoribus divisa.

MMM. Varii folliculi exterius in communi magno folliculo re-  
 tenti.

Va-

NNNNN. *Varii, & admodum diversi folliculi, cum in forma, tum in substantia, ex quibus conficiebatur fere tota interna tumoris compages, & admodum diversæ materiei repleti.*

OOOOO. *Ampla, ac superior cavitas ipsius tumoris materiei virulentæ repleta, partim saturatæ decoctioni granorum coffæ, & partim melli simplici, varie consistentiæ, & glutinositatis, ad pondus circiter librarum XL.*

### EXPLICATIO TAB. III. F. I.

A. **U** *Terus, cujus fundus præter naturam expansus est sub magno tumore. Va-*

- BB. *Vagina magis expensa, & rugosa, & juxta longitudinem per dimidium secta.*
- C. *Uteri osculum.*
- DD. *Rugę ipsius Vaginę interius positę*
- EE. *Rotundum ligamentum sinistrum ex uteri fundo proveniens.*
- FF. *Tuba Faloppiana sinistra.*
- f. f. *Lacinia ipsius tubę in externo orificio positę.*
- GG. *Testiculus muliebris, sinister cum suo ovario, ovulisque scirrhosis, ac patentioribus redditus.*
- H. *Arteria spermatica sinistra ab exortu ad testem, tubam, & uteri fundum desinens.*
- I. *Vena spermatica sinistra.*
- L. *Ligamentum uteri latum, alijs*  
Ve-

*Vespertilionum Anatomis assimilatum, per quæ spermatica vasa ad tubam disseminantur.*

MM. *Arteriæ, & venæ hypogastricæ per uterum &c. divaricantes.*

NN. *Magnus tumor folliculatus totam abdominis anteriorem partem occupans, & aliquantisper sublevatus, & externè in quatuor partes divisus.*

OOOOOO. *Varii similiter parvi folliculati tumores sparsim per communem folliculum contenti, & coherciti, ac repleti, ut plurimum, ex humore albumini ovi simili.*

PP. *Varii folliculi intus retenti in magno folliculo, & positi in fun-*

*fundo ipsius magni tumoris, nec non repleti ex variis humoribus diversæ consistentiæ; Ac tubæ dexteræ arcte connexi cum exteriori communi folliculo: uti inter se ope cellularis membranae, & alicujus muscularis fibræ, nec non vasorum sanguiferorum.*

*QQQQ. Vasa arteriosa, & venosa promiscuè serpentina per communem folliculum externè, & internè, ex quibus totus tumor nutriebatur.*

### EXPLICATIO TAB. III. F. II.

**I**N qua folliculatus tumor in o-  
 Etogenariæ dextero testiculo ca-  
 su inventus, demonstratur.



- A. Uteri fundus in sua naturali,  
& anteriori positione.
- B. Uteri cervix.
- C. Uteri osculum.
- DD. Rugæ ipsius vaginae.
- EE. Arteriæ, & venæ hypogastricæ  
per uterum divaricantes.
- FF. Rotundi ligamenti ipsius uteri  
ex utraque parte.
- GG. Venæ spermaticæ ex utraque  
parte inferius translatae.
- HH. Arteriæ pariter spermaticæ  
ab ex ortu ad testes, tubas,  
& uteri fundum desinentes.
- II. Muliebris testiculus sinister fere  
in statu naturali.
- MMM. Folliculus membranofus ipsius  
tumoris in situ naturali, sum-  
mæ resistentiæ donatus, & in  
parte dextera positus. N.

- N. *Idem folliculus divifus, ac detractus, ut facilius tumoris cavum infpici poffit.*
- OOOO. *Subftantia ipfius tumoris undique repleta ex materia sebacea granofa, una cum pilis fimul fere in glomerem circinnatis, fpeciatim in medio.*
- PPPP. *Tubæ Faloppianæ ipfius uteri ex utraque parte.*
- QQ. *Ligamentum latum finiftrum uteri, alis Vefpertilionum Anatomicis affimilatum.*
- LLLL. *Lacinie membranofæ ipfarum Tubarum ex utraque parte.*

## INDEX OBSERVATIONUM.


|                                                                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <u>P</u> Utrida febris petecchialis cum molæ excretionē, & bipartitus uterus inventus. OBS. I. Pag.                                                       | 17 |
| <u>Monstruosum abdomen per difformem struma in testiculo muliebri enatum. OBS. II.</u>                                                                    | 27 |
| Catarrhus suffocativus ob nimiam tracheæ angustiam per bronchiales glandulas scirrhasas reditas. OBS. III.                                                | 45 |
| <u>Contumaciæ capitis dolor cum continuo frigoris sensu in Muliere, ob tumorem folliculatum in ventriculo sinistro ipsius Cerebri, inventum. OBS. IV.</u> | 49 |
| Peripneumonia, una cum cordis inflammatione ob scabiem caninam imprudeuter retropulsam. OBS. V.                                                           | 58 |
| Recurrentis hæmoptisis cum cordis palpitationibus per nimiam dilatationem, & Prolationem dexteri cordis, & speciatim venæ cavæ sinum. OBS. VI.            | 65 |
| Cordis palpitatio ob imprudenter suppressam consuetam hæmorrhoidalem evacuationem; & nimia cordis dexteri, una cum venæ cavæ sinu, dilatatio. OBS. VII.   | 72 |
| Febris continua putrida in Virgine cum pudendorum gangrena, & sphacelo superveniente, feliciter percurata. OBS. VIII.                                     | 81 |
| Uteri exulceratio cum diris convulsionibus. OBS. IX.                                                                                                      | 91 |
| Pilosus tumor in testiculo Muliebri octogenariæ inventus. OBS. X.                                                                                         | 98 |

# ERRATA

# CORRIGE

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Pag. 4. v. 13. fuscipere | suspiciere      |
| 11. v. 15. sana          | fanè            |
| 33. nota I.              | T.              |
| 37. v. 2. replicatam     | repletam        |
| 37. v. 6. replicati      | repleti         |
| 39 v. 9. L. I.           | L. O.           |
| 47. v. 1. radditas       | redditas        |
| 51. v. 8. congrui        | congruè         |
| 77. v. 10. ac ipsammet   | ac per ipsammet |
| 98. v. 4. nimizque       | minimizque      |
| 103. v. 7. fido          | fiat.           |


Tab: I



1

2

Tab: II







Tal









005655338

03

Digitized by Google

